VeDim
Veterinary Teleradiology

70, rue Nicolas Margue
4979 Fingig
Luxembourg

Ma Clinique Vétérinaire
10, rue de la république
38000 Grenoble
France
Tél. : 0612740467
e-mail : bruno.barthez@gmail.com

Ref : 35922 Martin^CELESTE

20 juil. 2017

Compte-rendu d'Examen d'Imagerie Médicale

Propriétaire
M. Martin
751, chemin de Ventabrin
38500 Voiron
adresse.proprietaire@provider.com

Vétérinaire traitant
Dr. Vet. Malakoff

Patient
CELESTE : Chien Westie
Femelle 9 ans

Scanner réalisé le 20 juillet 2017

Anamnèse

Anorexie 3 jours. Echo : masse abdominale (rein gauche).

vomissements, douleur abdominale.

Description

TECHNIQUE
Régions: Thorax et abdomen (bilan d'extension)
Nombre de séries d'images : 3
Coupes transverses de 1 – 1,5 mm
Injection IV de produit de contraste iodé (PCI): Oui

Thorax: Les poumons sont raisonnablement insufflés. Aucune lésion pulmonaire, médiastinale ou pleurale n'est mise en évidence. Plus particulièrement, aucun nodule pulmonaire ou adénomégalie thoracique n'est visible. Les structures osseuses avoisinantes sont dans les limites de la normale.

Abdomen: Le rein gauche n'est plus visible. Il a laissé place à une volumineuse masse mixte liquidienne et tissulaire contenant de nombreux fragments minéralisés. Cette masse mesure 6,5 cm de diamètre sur 12,6 cm de long et 6,5 cm de large.
Aucun signe d'épanchement rétropéritonéal n'est visualisé.
Après injection de PCI par voie veineuse, l'excrétion rénale à droite est conforme et le marquage urétérale et régulier jusqu'à la papille urétérale. Une bande de rehaussement est présente au sein de la cavité liquidienne et semble délimiter le cortex rénal résiduel du côté gauche.
L'examen des autres structures abdominales est dans les limites de la normale.

Conclusion

Accumulation liquidienne supposée sous-capulaire à hauteur du rein gauche, formant une volumineuse masse rétropéritonéale.
Absence d'anomalie décelable du rein droit et du thorax.

Dr Vet Franck Durieux , Dip ECVDI
Tél. :xxxxxx
E-mail :drfravet-vedim@yahoo.fr



Fig.1 : Reformatage dans le plan dorsal après injection de PCI par voie veineuse : Accumulation liquidienne sous-capsulaire à hauteur du rein gauche dont les contours sont nettement irréguliers



Fig.2 : Le rein gauche n'est plus reconnaissable. De matériel minéralisé est présent au sein du sac liquidien délimitant les contours du rein gauche.